

# PREVENCIÓN DEL VIH: VÍA MADRE-HIJO

SI UNA MUJER VIVE CON VIH Y ESTÁ EMBARAZADA, EXISTEN TRATAMIENTOS ESPECIALES PARA QUE EL VIRUS NO PASE AL BEBÉ. EL MÉDICO PODRÁ INDICAR CÓMO HACERLO, YA QUE NO ES LO MISMO ESTAR TOMANDO UNA MEDICACIÓN U OTRA QUE NO ESTAR TOMANDO NADA.



Usar preservativos durante el embarazo evita posibles reinfecciones.



Durante el parto y después de nacido el bebé, se les dará medicación a ambos. El bebé deberá ser controlado periódicamente durante el primer año.




Se recomienda no darle el pecho porque el virus puede pasar por la leche. En los Hospitales de la Ciudad se suministran inhibidores de la producción de leche materna y leche maternizada para los primeros seis meses del bebé. Después se le puede dar leche común.

## LOS TRATAMIENTOS PARA QUE LOS HIJOS DE LAS MUJERES QUE VIVEN CON VIH NAZCAN SIN VIRUS SON MUY EFICACES



La probabilidad de que el virus pase de la madre al hijo si no se realiza ningún tratamiento es de alrededor del 30%. En cambio, con la medicación y los controles adecuados, esta probabilidad baja a menos del 2%.



No siempre es necesario ni conveniente realizar cesárea. Hay recomendaciones especiales que establecen en qué situaciones es más seguro para las mujeres y los bebés optar por este tipo de parto. Entre los factores a tener en cuenta están: la carga viral de la madre y el número y tipo de partos previos.

## NO SE DEBE OLVIDAR QUE LA CESÁREA ES UNA OPERACIÓN IMPORTANTE QUE PUEDE TENER COMPLICACIONES

### RECOMENDACIONES

- Tomar el tratamiento para evitar la transmisión vertical del virus.
- No dar de mamar.
- Darle al bebé leche maternizada.
- Usar preservativo.

